

8 接种HPV疫苗后有哪些不良反应？

HPV疫苗的安全性已被广泛证实，接种HPV疫苗较常见的不良反应是注射部位（一般为上臂）胀痛或红肿、头痛、眩晕恶心或轻度发烧等，多为轻至中度，短期内可自行缓解。

9 来了月经，可以接种HPV疫苗吗？

如果没有发热、贫血、感染等特殊情况，经期可以注射HPV疫苗，但是由于经期大多女性有不同程度的不适，建议月经后再接种。

10 接种疫苗前需要做HPV检查吗？

包括世界卫生组织(WHO)、中华医学会妇科肿瘤学分会在内的国内外卫生机构指出，HPV疫苗接种前无需进行HPV检测。

我们是HPV家族




人类乳头瘤病毒

11 不在接种人群范围内的女性，想接种HPV疫苗可以到哪里接种？

鼓励其他年龄段女性根据自身实际情况接种适宜的HPV疫苗，全额自费，可通过网上预约公众号“广西疾控”，或自行前往所在区域的社区卫生服务中心或者公立/私立医院咨询预约。

12 接种HPV疫苗后，是否还需要定期接受宫颈癌筛查？

需要。接种HPV疫苗并不能100%预防宫颈癌，无论是否接种HPV疫苗，均需定期接受宫颈癌筛查。WHO建议普通女性可以在30岁开始定期接受宫颈癌筛查。



广西壮族自治区

适龄女生人乳头瘤病毒

(HPV) 疫苗免费接种项目

常见问题回复指引



广西壮族自治区卫生健康委员会
广西壮族自治区疾病预防控制中心



1 什么是宫颈癌？

宫颈癌是我国女性最常见的恶性肿瘤之一，已成为严重的公共卫生问题。我国的宫颈癌发病率呈逐年上升趋势且愈发年轻化，2023年ICO/IARC中国HPV相关疾病报告显示，2020年我国新发宫颈癌近11万例。接种HPV疫苗是预防宫颈癌的重要手段。

2 为什么要接种HPV疫苗？

HPV又称人乳头瘤病毒，有200多种亚型，根据有无致癌性分为高危型和低危型，不同型别的HPV感染可引起不同疾病，高危型HPV持续感染可引起子宫颈、阴道、外阴、肛门、阴茎、头颈等部位的癌；低危型HPV感染可引起皮肤疣、肛门-生殖器疣和复发性呼吸道乳头状瘤等疾病。几乎所有宫颈癌都与高危型HPV持续感染有关，最常见的是HPV16和18型。尽早接种HPV疫苗是预防宫颈癌等HPV感染相关疾病最经济有效的手段，可显著降低HPV持续感染、癌前病变和宫颈癌的发病率。

3 为什么将接种年龄围确定在满13周岁未满14周岁在校初中女生？

这主要是由HPV感染特征、疫苗预防效益决定的。WHO在2017年HPV疫苗立场性文件中建议，接种HPV疫苗的主要目标人群是性活跃之前9-14岁女孩。将满13周岁未满14周岁在校初中女生作为HPV疫苗接种的重点目标人群，优先保障接种，通过提升接种率，降低其未来感染风险，实现宫颈癌的一级预防。

4 哪些人可以在广西免费接种HPV疫苗？

接种人群为我区满13周岁未满14周岁且未接种过HPV疫苗的在校初中女生，遵照知情自愿，免费接种原则。

5 不同“价”别的HPV疫苗有什么区别？

HPV疫苗的“价”代表疫苗覆盖的HPV病毒型别的数量，价数越高，代表疫苗预防HPV型别越多。目前我国上市的HPV疫苗有二价、四价、九价三种，家长可自主选择HPV疫苗进行接种，无论接种哪一种HPV疫苗，早接种早保护。目前广西免费为适龄女生接种可以有效预防最常见高危型HPV16和18型感染的国产二价HPV疫苗。

6 HPV疫苗可以与其他疫苗同时接种吗？

不推荐HPV疫苗与其他疫苗同时接种。如HPV疫苗与免疫规划疫苗接种时间发生冲突，应优先接种免疫规划疫苗，再接种HPV疫苗，接种间隔应大于14天；如因动物致伤、外伤等原因需接种狂犬疫苗、破伤风疫苗、免疫球蛋白时，可不考虑与HPV疫苗的接种间隔。

7 哪些情况不适合接种HPV疫苗？

- (1) 如果身体不适，如发热、急性疾病或慢性疾病的急性发作期，应在疾病治愈或稳定后再接种；
- (2) 对疫苗的活性成分或任何辅料成分有超敏反应的人群不宜接种；
- (3) 注射HPV疫苗后有超敏反应症状者，不应再次接种；
- (4) 妊娠期妇女；
- (5) 其他接种禁忌详见疫苗说明书。

HPV
&
宫颈癌

